

تجرباتی

سمیرا شادفر

نکات مهم و ضروری داروهای تریالی کد



آدرنالین Epinephrine

گروه درمانی : گشادکننده نایژه ، تنگ کننده عروق ، آدرنالین محرک قلبی ، داروی کمکی در بی حسی موضعی ، بند آورنده خونریزی موضعی (داروی تقلد سمیاتیك)
مصرف در حاملگی : گروه C
اشکال دارویی :

NDC 61570-300-31

Adrenalin[®] Chloride Solution

(Epinephrine Nasal
Solution, USP)

1 mg per mL

Vasoconstrictor

**For Topical
Application**

1:1000

R_x Only

1 fl oz (30 mL)

 **Monarch
Pharmaceuticals[®]**

Inj : 1mg/ml

راه تجویز : IV/IM/SC

اندیکاسیون ، راه مصرف و دواژ :


۱. درمان آنافیلاکسی شدید یا **آسم** ، گشاد کردن نایژه

بالغین : در بزرگسالان مقدار 0/1-0/5mg به صورت **وریدی** و یا زیرجلدی تجویز می شود .
کودکان : مقدار 0/01 mg/kg به صورت زیرجلدی تجویز می شود
۲. برگشت ریتم قلب در **ایست قلبی**

بالغین : 0/1-0/5mg/IV و در صورت نیاز هر 3 الی 5 دقیقه تکرار شود .
کودکان : 0/01 mg/kg/IV و در صورت نیاز هر 3 الی 5 دقیقه تکرار شود .
شیرخواران : 0/01-0/03 mg/kg/IV و در صورت نیاز هر 3 الی 5 دقیقه تکرار شود .
۳. هموستاتیک (بند آورنده خونریزی موضعی)

بالغین : از غلظت های 1/1000 به صورت موضعی

۴. طولانی کردن اثر بی حس کننده موضعی



گروه درمانی : ضد آریتمی
 مصرف در حاملگی : گروه C
 اشکال دارویی :
 Injection : 3mg/ml

(2ml)

اندیکاسیون ها ، راه مصرف و دوزاز :
 1) درمان تکیکاردی حمله ای فوق بطنی (PSVT) و برگشت آن به ریتم سینوسی :
 بالغین : 6mg از راه وریدی و به صورت بلوس وریدی طی 1-2 ثانیه و در صورتی که PSVT بعد از یک تا دو دقیقه بهبود نیافت ، 12mg از راه تزریق سریع وریدی تجویز می گردد . در صورت لزوم می توان 12mg دیگر نیز تکرار کرد . دوز منفرد بیش از 12mg توصیه نمی شود .



دوبوتامین هیدروکلراید Dobutamine Hydrochloride

گروه درمانی : داروی اینوتروپیک

مصرف در حاملگی : گروه B

اشکال دارویی

:

Inj :



12.5 mg/ml(in 20 ml Vials)

اشکال دارویی دوبوتامین

• تزریقی

اطلاعات دارویی دوبوتامین

داروی دوبوتامین عضله قلب را تحریک کرده و با کمک به افزایش **پمپاژ قلب**، جریان خون را بهبود می‌بخشد. دوبوتامین برای درمان **مشکلات قلبی** ناشی از ضعف عضله قلب، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوبوتامین معمولاً بعد از آزمایش سایر داروهای قلبی که بدون موفقیت بوده‌اند، تجویز می‌شود.

مقدار و روش درست مصرف داروی دوبوتامین

- قبل از شروع درمان با این دارو، پزشک دارویی داخل بسته را به دقت مطالعه کنید. این پزشک به شما کمک می‌کند تا **اطلاعات دارویی** را راجع به دارو به دست آورده و از عوارض جانبی احتمالی آن مطلع شوید.
- دوز و مقدار داروی دوبوتامین، از فردی به فرد دیگر متفاوت است؛ دارو را دقیقاً همانطور که **پزشک** برایتان تجویز کرده است، استفاده نمایید.
- این دارو در بیمارستان به صورت **وریدی** و زیر نظر پرستار و پزشک تزریق می‌شود.
- در هنگام استفاده از این دارو، تمامی علائم حیاتی بیمار از جمله تنفس، ضربان قلب، فشار خون و میزان اکسیژن باید کنترل شود.
- اگر این دارو را در خانه تزریق می‌کنید و دوزی از دارو را فراموش کردید، حتماً با پزشکتان تماس بگیرید تا راه حل مناسبی را به شما پیشنهاد کند.

موارد منع مصرف دوبوتامین

- به تاریخ انقضای داروی دوبوتامین توجه کنید و اگر دارویی که در دستتان است تاریخ انقضای آن تمام شده است، از آن مصرف نکنید.
- هرگز داروی Dobutamine را به فرد دیگری حتی با علائم مشابه خودتان تجویز نکنید.



Spray : 400 mvg/dose

اندیکاسیون ، راه مصرف و دواژ :

۱. پیشگیری از حملات آنژین مزمن :

بالغین : 9g – 5/2 خوراکی هر 8-12 ساعت یا 5/0Inch از پماد 2٪

۲. کاهش درد در آنژین صدری حاد ،

پروپیلاکسی از حملات کوچک آنژین

بالغین : یک قرص زیر زبانی مصرف می شود ،
این دوز هر 5 دقیقه یک بار تا 15 الی 30 دقیقه تکرار می شود .

۳. نیتروگلیسرین برای کنترل کنترل

هیپرتانسیون در خلال جراحی ، نارسایی

احتقانی قلب همراه با MI و کاهش درد

آنژین صدری در شرایط حاد دارد.

اندیکاسیون ، راه مصرف و دواژ

بالغین : ابتدا 5mcg/min از راه انفوزیون
وریدی تجویز می شود . در صورت نیاز هر 3 تا 5 دقیقه ، 5mcg/min به دوز فوق اضافه شود تا زمانی که پاسخ مناسب ایجاد شود . در صورتی که با دوز 20 mcg/min افزایش یابد .

کنترل اندیکاسیون و موارد احتیاط :

۱. ابتلا به آنمی شدید

۲. افزایش فشار داخل جمجمه

۳. هیپوتانسیون ارتواستاتیک

۴. MI زودرس

۵. حساسیت مفرط یا سابقه ایدیدسنکراتیت

به نیترات ها



Furosemide فوروزمايد

گروه درمانی : دیورتیک
مصرف در حاملگی : گروه C
اشکال دارویی :



عوارض و فواید فوروزماید

نام ژنریک: فوروزماید

نام تجاری: روزماید - لازیکس

شکل دارویی:

• آمپول ۲۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر

• آمپول ۴۰ میلی گرم در ۴ میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک: مدر موثر بر قوس هنله

طبقه بندی درمانی: مدر ، کاهنده **فشار خون**



فنی توئین PHENYTOIN

گروه درمانی : ضد تشنج ، مشتق هیدانتوئین

مصرف در حاملگی : گروه D

اشکال دارویی :



Cap
: 50

,
100
mg

Inj :
250

mg/5ml

Susp : 30mg/5ml

راه تجویز : IV Inf / IV / PO

mg/5ml

Susp : 30mg/5ml

راه تجویز : IV Inf / IV / PO

اندیکاسیون ها ، راه مصرف و دوزاژ :

۱. درد نوروپاتیک (میگرن ، نورالژی تری

ژمینال و فلج بلز)

بالغین : 200-600mg از راه خوراکی در

دوزهای منقسم

۲. درمان تشنج - کلونیک ، درمان تشنج

نورولپتیک، درمان استاتوس اپی لپتیکوس

بالغین : 10-15 mg/kg وریدی به آهستگی)

(50mg/min) تجویز گردد . دوز خوراکی 1gr)

در سه دوز 200mg, 300 mg, 400mg با

فواصل 2 ساعت) و دوز نگهدارنده 300mg

کودکان : 15 mg/kg وریدی به آهستگی)

(50mg/min) تجویز گردد. دوز خوراکی tid/

15mg/kg و دوز نگهدارنده 4-8 mg/kg از راه

خوراکی یا وریدی هر 12 ساعت

۳. تشنج در افراد تحت درمان با فنی توئین

که یک یا چند دوز دریافت نکردند .

بالغین : روزانه 100-300mg/IV (سرعت

تزریق 50mg/min)

کودکان : 5-7mg/IV: (سرعت تزریق

50mg/min)

۴. دیس ریتمی های بطنی که به لیدوکائین

پاسخ ندادند و دیس ریتمی های ناشی از

گیکو.یدهای قلبی



هالوپریدول Haloperidol

گروه درمانی : بوتیروفنون ها گروه دارویی ،
ضد سایکوز

مصرف در حاملگی : گروه C
اشکال دارویی :



بهترین نکات هالوپریدول

بهترین نکات هالوپریدول

قرص هالوپریدول که با نام تجاری هالدول فروخته می شود، یک داروی ضد روانپریشی تیپیک است. قرص هالوپریدول در **درمان اسکیزوفرنی، بیماری تیک در سندرم توره، دوره شیدائی (مانیا) در اختلال دوقطبی یا دو قطبی، دلیریوم، بی قراری شدید، سایکوز و روانپریشی، و توهم بینایی در ترک الکل** استفاده می شود. **داروی هالوپریدول** را می توان از راه دهان یا تزریق به عضله یا وریدی مصرف نمود. داروی هالوپریدول معمولاً بعد از حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه عمل می کند.