سمیرا شادفر

# نکات مهم وضروری داروهای ترالی کد

# آدرنالین Epinephrine

**گروه درمانی :** گشادکننده نایژه ، تنگ کننده عروق ، آدرنالین محرک قلبی ، داروی کمکی در بی حسی موضعی ، بند آورنده خونریزی موضعی (داروی مقلد سمپاتیک)

**مصرف در حاملگی :** گروه C

**اشکال دارویی :**



Inj : 1mg/ml

**راه تجویز** : IV/IM/SC

**اندیکاسیون ، راه مصرف و دواژ** :

۱. **درمان آنافیلاکسی شدید یا آسم ، گشاد کردن نایژه**

بالغین : در بزرگسالان مقدار 0/1-0/5mg به صورت وریدی و یا زیرجلدی تجویز می شود .

کودکان : مقدار 0/01 mg/kg به صورت زیرجلدی تجویز می شود

۲. **برگشت ریتم قلب در ایست قلبی**

بالغین : 0/1-0/5mg/IV و در صورت نیاز هر 3 الی 5 دقیقه تکرار شود .

کودکان :0/01 mg/kg/IV و در صورت نیاز هر 3 الی 5 دقیقه تکرار شود .

شیرخواران : 0/01-0/03 mg/kg/IV و در صورت نیاز هر 3 الی 5 دقیقه تکرار شود .

۳. **هموستاتیک (بند آورنده خونریزی موضعی)**

بالغین : از غلظت های 1/1000 به صورت موضعی

۴. **طولانی کردن اثر بی حس کننده موضعی**

**گروه درمانی** : ضد آریتمی
**مصرف در حاملگی** : گروه C
**اشکال دارویی** :
Injection : 3mg/ml
(2ml)

**اندیکاسیون ها ، راه مصرف و دوزاژ :**
1) درمان تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی (PSVT ) و برگشت آن به ریتم سینوسی :
بالغین : 6mg از راه وریدی و به صورت بلوس وریدی طی 2-1 ثانیه و در صورتی که PSVT بعد از یک تا دو دقیقه بهبود نیافت ، 12mg از راه تزریق سریع وریدی تجویز می گردد . در صورت لزوم می توان 12mg دیگر نیز تکرار کرد .دوز منفرد بیش از 12mg توصیه نمی شود .

# دوبوتامین هیدروکلراید
# Dobutamine Hydrochloride

**گروه درمانی :** داروی اینوتروپیک

**مصرف در حاملگی :** گروه B

**اشکال دارویی :**

Inj :

12.5 mg/ml(in 20 ml Vials)

## اشکال دارویی دوبوتامین

- تزریقی

## اطلاعات دارویی دوبوتامین

داروی دوبوتامین عضله قلب را تحریک کرده و با کمک به افزایش **پمپاژ قلب** ، جریان خون را بهبود می‌بخشد. دوبوتامین برای درمان **مشکلات قلبی** ناشی از ضعف عضله قلب ، در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوبوتامین معمولاً بعد از آزمایش سایر داروهای قلبی که بدون موفقیت بوده‌اند، تجویز می‌شود.

## مقدار و روش درست مصرف داروی دوبوتامین

- قبل از شروع درمان با این دارو، بروشور دارویی داخل بسته را به دقت مطالعه کنید. این بروشور به شما کمک می‌کند تا **اطلاعات دارویی** را راجع به دارو به دست آورده و از عوارض جانبی احتمالی آن مطلع شوید.
- دوز و مقدار داروی دوبوتامین ، از فردی به فرد دیگر متفاوت است؛ دارو را دقیقاً همانطور که **پزشک** برایتان تجویز کرده است، استفاده نمایید.
- این دارو در بیمارستان به صورت **وریدی** و زیر نظر پرستار و پزشک تزریق می‌شود.
- در هنگام استفاده از این دارو، تمامی علائم حیاتی بیمار از جمله تنفس، ضربان قلب، فشار خون و میزان اکسیژن باید کنترل شود.
- اگر این دارو را در خانه تزریق می‌کنید و دوزی از دارو را فراموش کردید، حتما با پزشکتان تماس بگیرید تا راه حل مناسبی را به شما پیشنهاد کند.

## موارد منع مصرف دوبوتامین

- به تاریخ انقضای داروی دوبوتامین توجه کنید و اگر دارویی که در دستتان است تاریخ انقضای آن تمام‌شده است،از آن مصرف نکنید.
- هرگز داروی Dobutamine را به فرد دیگری حتی با علائم مشابه خودتان تجویز نکنید.

# نیتروگلیسیرین
# Nitroglycerin

**گروه درمانی :** ضد آنژین ، وزادیلاتور
**مصرف در حاملگی :** گروه C
**اشکال دارویی :**



Tab : 0/4mg – Tab (ER) : 2.5mg , 2.6mg , 6.4mg

Cap : 0.4mg – Cap (ER) : 2.5mg ,2.6mg , 6.4mg

Inj : 1mg/ml , 5mg/ml (2ml – 5ml – 10ml)

Oint : 2%

Plasrer : 5mg/24h , 10mg/24h

Spray : 400 mvg/dose

## اندیکاسیون ، راه مصرف و دواژ :

۱. پیشگیری از حملات آنژین مزمن :

بالغین : 9g – 5/2 خوراکی هر 8-12 ساعت یا 5/0Inch از پماد 2٪

۲. کاهش درد در آنژین صدری حاد ، پروفیلاکسی از حملات کوچک آنژین

بالغین : یک قرص زیر زبانی مصرف می شود ، این دوز هر 5 دقیقه یک بار تا 15 الی 30 دقیقه تکرار می شود .

۳. نیتروگلیسیرین برای کنترل کنترل هیپرتانسیوندر خلال جراحی ، نارسایی احتقانی قلب همراه با MI و کاهش درد آنژین صدری در شرایط حاد دارد.

## اندیکاسیون ، راه مصرف و دواژ

بالغین : ابتدا 5mcg/min از راه انفوزیون وریدی تجویز می شود . در صورت نیاز هر 3 تا 5 دقیقه ، 5mcg/min به دوز فوق اضافه شود تا زمانی که پاسخ مناسب ایجاد شود . در صورتی که با دوز 20 mcg/min افزایش یابد .

## کنتراندیکاسیون و موارد احتیاط :

۱. ابتلا به آنمی شدید
۲. افزایش فشار داخل جمجمه
۳. هیپوتانسیون ارتواستاتیک
۴. MIزودرس
۵. حساسیت مفرط یا سابقه ایدیدسنکراتیت به نیترات ها

# فوروزماید Furosemide

**گروه درمانی :** دیورتیک

**مصرف در حاملگی :** گروه C

**اشکال دارویی :**

# عوارض و فواید فوروزماید

نام ژنریک:فوروزماید

نام تجاری:روزماید - لازیکس

## شکل دارویی:

- آمپول ۲۰ میلی گرم در ۲ میلی لیتر
- آمپول ۴۰ میلی گرم در ۴ میلی لیتر

طبقه بندی فارماکولوژیک :مدر موثر بر قوس هنله

طبقه بندی درمانی :مدر ، کاهنده **فشار خون**

# فنی توئین PHENYTOIN

**گروه درمانی :** ضد تشنج ، مشتق هیدانتوئین

**مصرف در حاملگی :** گروه D

**اشکال دارویی :**

Cap : 50 ، 100 mg

Inj : 250 mg/5ml

Susp : 30mg/5ml

**راه تجویز :** IV Inf / IV / PO

mg/5ml

Susp : 30mg/5ml

**راه تجویز** : IV Inf / IV / PO

**اندیکاسیون ها ، راه مصرف و دوزاژ :**

۱. درد نوروتیک (میگرن ، نورالژی تری ژمینال و فلج بلز )

بالغین : 200-600mg از راه خوراکی در دوزهای منقسم

۲. درمان تشنج –کلونیک ، درمان تشنج نورولپتیک،درمان استاتوس اپی لپتیکوس

بالغین : 10-15 mg/kg وریدی به آهستگی( 50mg/min) تجویز گردد . دوز خوراکی 1gr ( در سه دوز 200mg, 300 mg, 400mg با فواصل 2 ساعت ) و دوز نگهدارنده 300mg

کودکان : 15 mg/kgوریدی به آهستگی( 50mg/min) تجویز گردد. دوز خوراکیtid/ 15mg/kgو دوز نگهدارنده 4-8 mg/kg از راه خوراکی یا وریدی هر 12 ساعت

۳. تشنج در افراد تحت درمان با فنی توئین که یک یا چند دوز دریافت نکردند .

بالغین : روزانه 100-300mg/IV ( سرعت تزریق 50mg/min)

کودکان :5-7mg/IV ( سرعت تزریق 50mg/min)

۴. دیس ریتمی های بطنی که به لیدوکائین پاسخ ندادند و دیس ریتمی های ناشی از گیکو.یدهای قلبی

# هالوپریدول Haloperidol

**گروه درمانی** : بوتیروفنون ها گروه دارویی ، ضد سایکوز

**مصرف در حاملگی** : گروه C

**اشکال دارویی** :

# بهترین نکات هالوپیریدول

بهترین نکات هالوپیریدول

قرص هالوپریدول که با نام تجاری هالدول فروخته می شود، یک داروی ضد روانپریشی تیپیک است. قرص هالوپریدول در **درمان اسکیزوفرنی**، **بیماری تیک در سندرم توره**، دوره شیدائی (مانیا) در **اختلال دوقطبی** یا دو قطبی، دلیریوم، بی قراری شدید، سایکوز و روانپریشی، و توهم بینایی در ترک الکل استفاده می شود. **داروی هالوپیریدول** را می توان از راه دهان یا تزریق به عضله یا وریدی مصرف نمود. داروی هالوپیریدول معمولا بعد از حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه عمل می کند.